





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDijaus 24 02 2022



Nhèu ventada



Nhèu umida



Eth problema de nhèu ventada requerís atencion. Possibles purgues de nhèu umida ath long deth dia e lauegi d'esguitlament basau.

Es plaques de vent ja non deth tot recentes deth deluns se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes e pòc freqüentades orientades ath nòrd e èst per dessús des 2200 m approximativament. Atencion especiaument enes sòns marges. Aguestes repòsen ath dessús de coches trendes. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. En particular deth limit damp era Ribagòrça enquiat limit damp eth Palhars aguestes pòden desencadenar-se damp facilitat e, de manera isolada, arténher mida mejana.

Ath long dera jornada: Damp era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solar, son encara possibles purgues de nhèu umida ath long deth dia de mida petita. Enes soms e es crestes der aiguavèrs damp era Arièja e era Palharesa: Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentiuá der itinerari. Es plaques de vent s'an d'evitar sustot en pales fòrça inclinades. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren. Sustot enes pales orientades a oèst e nòrd: A causa dera crosta dura i a eth perilh d'esguitlar e quèir tanben en pales moderadament arribentes.

Celh de nhèu

Deluns: Eth vent damp bohades plan fòrtes a transportat intensament era nhèu recenta. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes non s'an estacat ben damp era nhèu vielha especiaument en pales ombrères emparades deth vent. Es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu sustot enes pales damp plaques de vent.

Per dessús des 2000 m approximativament son presenti de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes mejanas e nautes pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Dijaus: Damp eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida. Eth perilh de



Iauegi de placa seca non diminuirà pas encara.