


Grad de perilh 2 - Moderat



Era nhèu ventada e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada an d'avalorarse damb prudéncia sustot en pales ombrères fòrça arribentes e pòc freqüentades e en còtes nautes e nauta montanha. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades moderades deth quadrant sud-èst, eth dissabte, s'an format plaques de vent ben visibles. Aguestes pòden de manèra isolada desencadenar-se facilmente, mès majoritariamente arribar a dimensions petites. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de còths e crestes e tanben ena entrada de canaus e conques.

Enes pales erbooses extrèmament arribentes son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Ath delà ath long dera jornada, enes pales orientadi a sud e oèst, son probables quauqu'uns purgues de nhèu umida.

Celh de nhèu

Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches tendes sustot en pales ombrères emparades deth vent. Aguestes demoren en part inestables. Eth deluns serà soleienc Damb era pujada de temperatures e era fòrta radiacion solara, en cors dera jornada eth mantèth de nhèu se fixarà.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbièn fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Dimars: A conseqüéncia dera umitat der aire, leugèr augment deth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. Clar afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.