




Grad de perilh 2 - Moderat



Coches febles persistentes e esguitlaments son era hònt principau de perilh. Enes vals que tèrmien damb era Palharsa se manten perilh moderat (2).

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes pòden, de manèra isolada, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en pales fòrça arribentes orientades ath nòrd-oèst, nòrd e nord-èst e en còtes mejanes e nautes. Aguestes repòsen ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha. Es lauegi son en generau de mida petita. En sector deth Pòrt dera Bonaigua, enes vals de Gerber e Àrreu e ena val de Marimanha e eth circ de Baciver e per dessús des 2100 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei Moderat 2. Ena rèsta de sectors, aguesti endrets perilhosi son mès rari e eth perilh ei Feble 1.

Enes zònes ombrères e emparades deth vent: Eth mantèth de nhèu s'a facetat e ei feble. Aquesta nhèu se pòt desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales de pendent extrem orientades ath nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Ací es lauegi son sonque superficiaus.

Ath delà a compdar de meddia, enes pales orientadi a sud-èst, sud e oèst, son probables quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau de mida petita.

Celh de nhèu

A compdar de meddia eth temps serà caud Ath long dera jornada era radiacion solara causarà enes pales soleienques arribentes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu enes pales ombrères.

Per dessús deth limit deth bòsc son presenti de 50 a 70 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes mejanes e nautes es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. En còtes baishes i a pòca nhèu.

Tendència

Deluns: Eth perilh de lauegi de nhèu seca e umida non diminuirà pas encara.