


## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDimars 05 12 2023 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuénzia: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Petit**

### Nhèu ventada recenta en cors dera jornada.

Era nhèu recenta heireda e plaques de vent en generau petites formades pendent era nheuada pòden, en quauqui casi encara , èster desencadenades de manera accidentau. Eth deluns queirà un shinhau de nhèu. Eth vent deth sud-oèst transportarà era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada se formaràn enes pales apròp des crestes orientades ath nòrd e èst e generaument en còtes nautes. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar. Es lauegi sequi son en generau de mida petita. Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir ua persona.

Actuaument, eth serviç de predicción de lauegi a informacion limitada deth mantèth de nhèu. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau.

### Celh de nhèu

Damb eth fòrt heiredament, ath long dera dimenjada eth mantèth de nhèu s'a consolidat. Enes darrèri dies an queigut 15 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument mès. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes demoren en part inestables. Es naues acumulacions de nhèu ventada seràn cada viatge mès inestables sustot en orientacions nòrd enquiar èst peth nòrd-èst e generaument en còtes nautes.

Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 20 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes mejanas e nautes pera influéncia deth vent. En còtes baishes non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendéncia

Dimars: A consequéncia dera nhèu recenta e eth vent, adicionau aument deth perilh de lauegi de nhèu seca.