



Grad de perilh 3 - Mercat




Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDimenge 18 02 2024



Nhèu recenta



N
S



2000m



Nhèu umida



N
S



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt präube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Estabilitat deth celh de nhèu: **präube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

A queigut mès nhèu dera prevista. Eth problema de nhèu recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb era nheuada, ath long dera jornada son probables lauegi de nhèu seca, tanben de mida mejana. Aguestes pòden desencadenar-se damb ua subrecarga febla o naturaument. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales arribentes per dessús des 2000 m aproximativament e tanben apròp des crestes, en canaus e conques.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida de mida petita e, locaument, mejana en totes es còtes.

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e precaucion.

Celh de nhèu

En ua zòna grana enes darrères ores an queigut de 20 a 30 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès. Ath long deth vèspe eth vent a estat momentanèament mès fòrt deth previst.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn enes pales soleienques arribentes en totes es còtes ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu.

Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 40 a 60 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes baishes non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuerne.

Tendéncia

Dimenge: Era activitat de lauegi de nhèu seca diminuirà progressivament. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, locau aument deth perilh de lauegi de nhèu umida.