


Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
en diuendres, 27 de Deseme de 2024




Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: molt pobre

freqüència: algunes

Mida d'allau: petita



Lliscament de
neu



freqüència: poques

Mida d'allau: mitjana

Era hònt principau de perilh consistís en purgues de nhèu umida e lauegi d'esguitlament basau.

Damb eth heiredament era situacion de lauegi qu'ei favorabla ath maitin en fòrça endrets. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles nau purgues e lauegi de nhèu umida, tanben de mida mejana. Ath delà son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana.

En altitud, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara de manèra fòrça isolada. Aguestes darrères son de manèra isolada de mida mejana.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren. En particular enes pales ombrères: A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitar e quèir.

Mantell de neu

En particular enes pales soleienques: Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendrà ath long deth dia. Enes pales ombrères: Era part superiora deth mantèth ei dura, damb ua crosta non portanta en superfícia. Era part inferior deth mantèth ei umida.

En còtes mejanes son presenti de 50 a 100 cm de nhèu. Per dessús deth limit deth bosc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Diuendres: Eth perilh de lauegi de nhèu umida non diminuirà pas encara.