


Grau de Perill 3 - Marcat



Era nhèu recenta e era nhèu ventada les cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent abondiues. Aguesta nhèu e en particular plaques de vent soent grossudes pòden èster facilmente desencadenades accidentaument per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi son en part de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben apròp de crestes, en canaus e conques. Especiaument deth limit damb Benasc enquiath limit damb era Ribagòrça e eth Palhars, aguesti endrets perilhosi son mès freqüenti.

Es tèsti d'estabilitat e es henerècles que propaguen indiquen qu'era situacion de lauegi ei fòrça delicada enes pales damb plaques de vent.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar de meddia son possibles lauegi de nhèu umida sense coesion, mès majoritariament petiti.

Son necessàries fòrça experiència ena avaloracion deth perilh de lauegi e era màger prudència.

Mantell de neu

Especiaument ath sud e ath sud-oèst a compdar de dimars an queigut de 15 a 20 cm de nhèu. Enquiara maitiada queirà de 15 a 20 cm de nhèu per dessus des 1200 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth nòrd-oèst transportarà intensament era nhèu recenta.

Era part superiora deth mantèth presente ua estratificacion desfavorable, damb ua superfície formada per nhèu de febla coesion qu'arrepòse sus ua crosta de regèu.

Per dessus deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. En toti es sectors i a mens nhèu dera acostumada.

Tendència

Damb era atenuacion dera nheuada, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.