






Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en augment
en dimenge, 18 de Gèr de 2026



Placa de vent



^
Límit del bosc



Neu recent



^
1800m



^
2000m

Estabilitat del mantell de
neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Estabilitat del mantell de neu:

molt pobre

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



Capa feble
persistent

Nhèu recenta e nhèu ventada en cors dera jornada. Coches febles persistents enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu.

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, ath long dera jornada son probables purgues e lauegi de nhèu seca, que en quauqui endrets pòden arribar a èster mejans. Aguestes pòden progressivament desencadenar-se plan facilament o naturaument. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions e tanben enes pales damb plaques de vent. En particular en limit damb era Ribagorça e eth Palhars e en còtes mejanes e nautes, es endrets perilhosi son mès generalizadi e eth perillh ei mès gran.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant sud, ath long des darrèri dies, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent dures. Aguestes pòden èster desencadenades sustot per subrecargues fòrtes. Atencion especiaument enes sòns marges. Aguestes demoraràn caperadi de nhèu e per aquerò seràn de mau identificar. Principaument enes zònes de celh prim es coches febles ena nhèu vieja pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'ua persona. Aguestes son a viatges de mida mejana mès de manèra isolada de bon desencadenar. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu enes pales ombrères arribentes e damb pòc celh de nhèu. Ath delà, en còtes baishes, son probables en nombre creishent purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita e, locaument, mejana.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia e prudéncia.

Mantell de neu

Damb eth vent deth sud, enes darrèri dies s'an format plaques de vent. En particular enes zònes ombrères e emparades deth vent: Era cocha de nhèu recenta s'a facetat, damb ua superfícia de febla coesion. Especiaument enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu orientades a oèst, nòrd e èst, ath



laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles mercades.

Enquia dimenge queirà de 15 a 20 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. En particular per dessus deth limit deth bòsc: Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent seràn progressivament mès inestables sustot en pales ombrères arribentes e generaument en còtes mejanes e nautes.

En còtes mejanes son presenti de 70 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Dimenge: Adicionau augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.