



AM




PM



Grau de Perill 3 - Marcat

AM



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant
en dimeg, 22 de Heruèr de 2026



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**

PM



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimeg, 22 de Heruèr de 2026



Neu humida



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Es plaques de vent abondiues des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions. A compdar de meddia son probables lauegi de nhèu fòrça umida.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes pòden èster desencadenades damb facilitat de manera accidentau en totes es orientacions e per dessus deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosi se tròben especiaument en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent e tanben apròp des soms. Es lauegi son en part de mida mejana. De manera isolada, es lauegi pòden arténher mides granes.

Meddia e tarde: A compdar de meddia era probabilitat de desencadenament de lauegi umits e fòrça umits aumentarà rapidament enes pales soleienques arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Son probables lauegi naturaus de mida petita e mejana. Ath delà, son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiència ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.



Mantell de neu

Eth temps serà soleienc En ua zòna grana a compdar de dijaus an queigut de 15 a 20 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument mès.

Era nhèu recenta e en particular plaques de vent a viatges grossudes se tròben ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha. Especiaument enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

A compdar de meddia eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2400 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

I a mès nhèu dera acostumada. En còtes mejanes son presenti de 150 a 220 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendència

Dimenge: A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, adicionau augment deth perilh de lauegi de nhèu umida.