


## Grad de perilh 3 - Mercat



Era nhèu recenta e era nhèu ventada les cau avalorar damb atencion. Entà es excursions e es activitats dehòra de pista en terren inclinat, es condicions son perilholes.

Era nhèu recenta e en particular plaques de vent nombroses e a viatges granes pòden èster desencadenades damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau. Es acumulacions de nhèu ventada se placen especialment apròp des crestes, en canaus e conques en totes es orientacions e generalment en còtes nautes. Es endrets perilhos se tròben sustot enes pales arribentes èst a oèst peth sud. Es lauegi aciu son a viatges de mida perilhosament grana.

Damb era nhèu recenta, enes pales arribentes son probables lauegi de nhèu seca de mida mejana.

Aguesta nhèu se pòt desencadenar damb fòrça facilitat de manèra accidentau en totes es orientacions e generalment apròp deth limit deth bòsc.

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

## Celh de nhèu

A compdar de dimèrcles an queigut de 40 a 60 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument mès. Enquiat vèspe queiràn enquia 5 cm de nhèu en totes es còtes, locaument mens. Eth vent deth nord a transportat intensament era nhèu recenta.

Era nhèu recenta e tanben plaques de vent a viatges grossudes se tròben ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha especialment en pales ombrères.

## Tendéncia

Damb era atenuacion dera nheuada, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. A conseqüéncia dera radiacion solara, progressiu augment deth perilh de purgues de nhèu umida.