




Grad de perilh 2 - Moderat



Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh. Nhèu ventada recenta enes zònes ombrères e emparades deth vent.

Per dejós des 2200 m aproximativament son possibles purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita. Aguestes pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben enes pales arribentes de totes es orientacions.

Es plaques de vent mès recentes se depositaràn ath dessus de coches febles en orientacions nòrd-oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2200 m aproximativament. Aguestes son de mida petita mès en quauqui casi facilament pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben espciaument en terren arribent en còtes nautes e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Enes zònes ombrères e emparades deth vent: Era part superiora deth mantèth consistís en cristaus facetadi, damb gibra de superfície. Aguesta nhèu se pòt desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en pales ombrères de pendent extrem. Es lauegi aci son sonque superficiaus.

Celh de nhèu

A compdar deth maitin es condicions de temps primauerau causaràn en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Enes pales ombrères e per dessus des 2200 m aproximativament: Eth vent der oèst transportarà era nhèu recenta e era nhèu vieilha. Era part centrau deth mantèth ei en quauqui casi febla, damb ua superfície formada per nhèu de febla coesion.

En còtes mejanes e nautes son presenti de 60 a 120 cm de nhèu, locaument encara mès. Enes pales soleienques arribents en còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu.

Tendència

Dijaus: A conseqüència dera ploja, progressiu aument deth perilh de lauegi de nhèu umida.