






Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: Perill d'allaus constant →
en dimèrcles, 19 de Heruèr de 2025



Capa feble persistent



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **petita**

Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion. Purgues de nhèu umida a compdar de meddia.

Era nhèu recenta des darrèri dies s'a consolidat en pales ombrères e en còtes mejanes e nautes. Especiaument enes pales ombrères pòc freqüentades, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Naues acumulacions de nhèu ventada se formaràn enes pales apròp des crestes orientades ath èst, nòrd-èst e nòrd e generaument en altitud. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire per dessus des 2300 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben ena entrada de conques e canaus e tanben apròp de còths e crestes. Es lauegi pòden de manèra isolada arténher mida mejana.

Enes pales soleienques arribentes, son possibles purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita en totes es còtes.

Mantell de neu

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. A compdar de meddia eth solei e era calor causaràn enes pales soleienques arribentes ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'un mantèth de nhèu vieha de cristaus gròssi. Eth ligam entre es plaques de vent e damb era nhèu vieha ei locaument desfavorable.

Per dessus deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Especiaument enes pales soleienques en còtes baishes e mejanes i a pòca nhèu. En toti es sectors i a mens nhèu dera acostumada.

Tendència

Leugèr afebliment deth perill de lauegi.