


Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en dimèrcles, 17 de Deseme de 2025




Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



Lliscament de neu



freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

Nhèu ventada recenta en còtes nautes e nauta montanha. Encara possibles lauegi d'esguitlament basau.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Es naues acumulacions de nhèu ventada son facilament identificables e favorables ath desencadenament. Son possibles lauegi de mida petita e, locaument, mejana. Especiaument perilhosi son es pales apròp des crestes,. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Damb era penetracion dera umitat son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita per dejós des 2300 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Mantell de neu

An queigut de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument mens. En quauqui sectors eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Eth vent deth sud a transportat intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en pales ombrères en nauta montanha.

En còtes baishes e mejanes: Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà ath long deth dia.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.


Tendència

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.

Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: perill d'allaus en disminució
en dimèrcles, 17 de Deseme de 2025



Lliscament de neu



2300m

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**



Placa de vent



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

Era hònt principau de perillh consistís en lauegi d'esguitlament basau.

Damb era penetracion dera umitat son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita per dejós des 2300 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son en casi isoladi petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Es endrets perilhosi son rari e de bon reconéisher. Ath delà deth perillh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perillh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Mantell de neu

Enes darrères ores a queigut un shinhau de nhèu. Eth vent a estat de moderat a fòrt. Eth vent deth sud sonque a transportat pòca nhèu. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes repòsen ath dessús de coches desfavorables en pales ombrères en nauta montanha.

En còtes baixes e mejanes: Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà ath long deth dia.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Progressiu afebliment deth perillh de lauegi de nhèu seca.