





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en dimèrcles, 17 de Deseme de 2025



Placa de vent




2000m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



Lliscament de
neu



2300m

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de placa seca.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Especiaument ar èst e per dessús des 2000 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Ena mitat nòrd d'Aran, aguesti endrets perilhosi son mès rari e eth perilh ei inferior. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Damb era penetracion dera umitat son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita per dejós des 2300 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Mantell de neu

Enes darrères ores an queigut de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent a estat de moderat a fòrt. Eth vent deth sud a transportat intensament era nhèu recenta. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes repòsen ath dessús de coches desfavorables en pales ombrères en nauta montanha.

En còtes baishes e mejanes: Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà ath long deth dia.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.


Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en dimèrcles, 17 de Deseme de 2025



Placa de vent



Lliscament de
neu



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



2300m

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

Nhèu recenta e nhèu ventada en còtes nautes e nauta montanha. Encara possibles lauegi d'esguitlament basau.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Es naues acumulacions de nhèu ventada son facilament identificables e favorables ath desencadenament. Son possibles lauegi de mida petita e, locaument, mejana. Especiaument perilhosi son es pales apròp des crestes,. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Damb era penetracion dera umitat son encara possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita per dejós des 2300 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Mantell de neu

An queigut de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument mès. En quauqui sectors eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Eth vent deth sud a transportat intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en pales ombrères en nauta montanha.

En còtes baishes e mejanes: Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà ath long deth dia.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.