






Grau de Perill 2 - Moderat



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

Era hont principau de perill consistís en lauegi de placa seca.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument primes e favorables ath desencadenament. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi de nhèu seca de mida petita e, locaument, mejana. Sustot ath sud e ar èst e per dessus des 2200 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Ena mitat nòrd d'Aran, aguesti endrets perilhosi son mès rari e eth perill ei inferior. Ath delà deth perill d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perill d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

En particular enes pales arribentes soleienques: Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita en totes es còtes.

Mantell de neu

Especiaument ath sud e ar èst deluns an queigut de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth sud-èst a transportat intensament era nhèu recenta. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches desfavorables especiaument en pales ombrères en nauta montanha.

Enes pales soleienques e tanben en còtes baishes e mejanes: Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà ath long deth dia.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent.

Tendència

Progressiu afebliment deth perill de lauegi de nhèu seca.