





Grau de Perill 4 - Fort



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimars, 17 de Heruèr de 2026



Placa de vent



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **gran**



Neu humida



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **gran**



Neu recent



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**

Nhèu recenta e nhèu ventada. En còtes baixes e mejanes: Progressiu aument deth perillh de lauegi de nhèu umida.

Es plaques de vent dera dimenjada se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire. Aguestes demoraràn caperadi de nhèu e per aquerò seràn de mau identificar. Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth nòrd- oèst , a compdar dera maitiada , apròp des crestes, en canaus e conques e tanben en còtes mejanes e nautes se formaràn plaques de vent addicionaus. Aguestes son a viatges granes.

Enes pales arribentes enes zònes emparades deth vent: Damb era intensificacion des nheuades, son probables purgues e lauegi de nhèu seca, sustot de mida mejana.

Es lauegi sequi pòden desencadenar-se de manèra accidentau o naturau.

En particular en còtes baixes e mejanes: Damb era penetracion dera umitat, son probables lauegi de nhèu umida, tanben grani. Especiaument enes pales damb pòca nhèu ombrères en còtes mejanes: De manèra isolada, es lauegi pòden produsir un desencadenament ena nhèu vielha e arténher mides perilhosament granes. Ath delà, cau demorar lauegi d'esguitlament basau.

Es endrets perilhosi son nombrosi e de mau reconéisher damb pòga visibilitat.

Mantell de neu

Deluns: Eth temps serà fòrça embromat Enquiara tarde queirà de 30 a 40 cm de nhèu, locaument mèis. En ua zòna vasta queirà ploja enquiàs 2000 m. Eth vent deth nòrd-oèst transportarà era nhèu recenta.

En quauqui endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Era ploja causarà en totes es orientacions ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu. Especiaument enes



pales ombrèras, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. En còtes mejanes son presenti de 150 a 220 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendència

Dimars: Eth perilh de lauegi demorará invariable.