




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimecres, 18 de febrer de 2026



Placa de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **moltes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscament de neu



2200m

Les plaques de vent haurien de ser avaluades amb cautela en totes les orientacions en cotes mitges i altes. Amb la baixada de la cota de neu, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu humida.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden ser desencadenades molt fàcilment de manera accidental en totes les orientacions per sobre dels 2200 m aproximadament. Els indrets perillosos es troben especialment en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent i també prop dels cims. Les allaus aquí són sovint de mida mitjana.

Especialment als vessants amb poca neu obacs a cotes altes: De manera aïllada, les allaus poden desprendre's per la neu vella i atènyer mides perillosament grans.

En particular a cotes baixes: Amb la penetració de la humitat, són probables allaus de neu humida, que en alguns indrets poden arribar ser mitjanes. A més, són d'esperar allaus de lliscament basal en qualsevol moment.

Els indrets perillosos són nombrosos i difícils de reconèixer amb mala visibilitat.

Mantell de neu

El temps serà molt ennuvolat en una zona àmplia. Fins a la matinada cauran de 5 a 10 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament, localment més. El vent del nord transportarà la neu recent.

De manera aïllada la neu recent i la ventada reposen a sobre de capes toves. A la part basal del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats especialment als vessants obacs. La pluja ha causat una clara humidificació del mantell de neu en totes les orientacions per sota dels 1800 m aproximadament. En cotes mitges són presents de 150 a 220 cm de neu, localment més.



Tendència

Dimecres: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, provisional augment del perill d'allaus de neu humida.