






Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
en deluns, 16 de Març de 2026



Placa de vent



^
Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **moltes**
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



^
2200m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **gran**



Neu recent



^
1500m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **moltes**
Mida d'allau: **mitjana**

Es plaques de vent a viatges grossudes representen era hònt principau de perill.

Es plaques de vent abondiués se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions e generaument per dessus deth limit deth bòsc. Precaucion sustot enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son soent de mida mejana. De manèra isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha e, arténher mides granes sustot enes pales ombrères emparades deth vent.

Damb era nhèu recenta, ath maitin son possibles lauegi de nhèu seca, tanben de mida mejana. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar de meddia son possibles purgues de nhèu umida, mès majoritariamente petiti.

Es endrets perilhosi son nombrosi e de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes requerissen fòrça precaucion e prudència maximau.

Mantell de neu

A compdar d'ager an queigut de 15 a 20 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. Enquith meddia queiràn de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 1200 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta. Damb eth vent plan fòrt deth nòrd, en cors dera jornada es plaques de vent creixeràn.

Es plaques de vent repòsen ath dessus de coches febles especiaument en pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament. Especiaument perilhosi son en particular es endrets a on era gibra de superfícia



a demorat caperada de nhèu.

En còtes mejanes son presenti de 150 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.

Tendència

Deluns: Damb era fin des precipitacions, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, clar augment deth perilh de lauegi de nhèu umida.