



AM




PM



Grau de Perill 2 - Moderat

AM




Tendència: Perill d'allaus constant
en dimenge, 22 de Març de 2026

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

Neu humida



PM



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimenge, 22 de Març de 2026

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

Neu humida



Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion. Purgues e lauegi de nhèu umida en cors dera jornada.

En particular en còtes nautes: Principaument enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades, es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se encara en quauqui endrets. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Aguestes son a viatges de mida mejana e en quauqui casi de bon desencadenar. També aguestes pòden de manèra isolada arténher mida perilhosament grana.

Apròp de còths e crestes enes pales orientades a nòrd e oèst: Tanben se formaràn plaques de vent de mida mès a lèu petita.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables naui lauegi de nhèu umida, tanben de mida mejana. Es lauegi umits pòden desencadenar-se de



manèra accidentau o naturau. Ath delà, son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

Mantell de neu

En particular en còtes nautes enes zònes ombrères e emparades deth vent: Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Aguestes son favorables ath desencadenament. Es perfius estratigrafics e es tèsti d'estabilitat indiquen era estabilitat prauba deth mantèth de nhèu en aguesti sectors.

Ager a queigut un shinhau de nhèu. Eth vent feble a transportat pòca nhèu. Eth dissabte serà fòrça soleienc Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn enes pales soleienques ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

En còtes mejanes son presenti de 150 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.

Tendència

Eth dimenge serà fòrça soleienc Eth perilh de lauegi de nhèu umida augmentarà ath long deth dia. Eth perilh de lauegi de nhèu seca non disminuirà pas encara.