


Perill 24h.



Distribució



Situació



Perill 48h.




Un dia més anticiclònic amb pocs canvis pel que fa a l'estabilitat de la neu. Hem de seguir atents a les obagues obertes amb mantell prim que és on les capes de neu sucre enterrades podrien donar lloc a allaus grans i destructives. La probabilitat és molt baixa però les conseqüències poden ser greus. En terreny dret i obac, una fina capa superficial de neu sense cohesió es mobilitza amb facilitat i pot fer-nos perdre l'equilibri.

Capas febles persistents


Orientació



Cota



Mida



Probabilitat



La capa de neu sucre enterrat el 10 de gener encara dona resultats positius als tests d'estabilitat en obagues amb mantell prim, però fa més d'una setmana que no tenim notícies de cap accident lligat a aquest nivell. Les plaques que podem desencadenar poden tenir grans dimensions i enterrar un grup sencer. Hem de continuar sent conservador en aquest terreny i davant del dubte, clavar la sonda per a detectar a quina profunditat es troba la capa crítica i que té per sobre. No podem fer gaire cosa més.


En aquestes mateixes cotes i orientacions, en terreny molt dret és fàcil desencadenar purgues de neu pols reciclada que es posa ràpidament en moviment i pot fer-nos caure amb facilitat.

Lliscaments

Orientació



Cota



Mida



Probabilitat



Encara avui esperem caigudes de plaques de fons en vessants habituals a partir de migdia. La probabilitat va a la baixa amb l'inici del descens de temperatura que esperem a partir de la tarda.


Estat de la neu

La neu és present des del fons de vall i n'hi ha suficient per lliscar des dels 1300 m en vessants obacs i 1600 m a les solanes. Els gruixos a 2200 m rondan els 150 cm, una mica per sota la mitjana per l'època de l'any. La qualitat de la neu és molt variable en cotes i orientacions. A les solanes la trobem primavera, amb cicles diaris de fusió-regel. Les obagues les trobarem molt variables, amb zones de neu pols amb gebre de superfície, neu ventada i crostes superficials que es trenquen amb els esquís.

A la part basal del mantell dels vessants obacs es manté la capa de neu sucre (gobelets) molt desenvolupada i a una profunditat variable que encara és reactiva als tests quan està a menys d'un metre de la superfície i que és l'origen del principal problema de perill.

Meteo

Avui dijous el dia serà anticiclònic amb cel blau i temperatures altes al matí i que aniran baixant de cara al vespre. Demà divendres ens creua un front fred pel nord-oest que farà que el dia es mantingui tapat. Es podran acumular uns 10 cm de neu nova per sobre dels 1500 m. El vent bufarà moderat del nord-oest als cims.



24h.



48h.



Predictor: Jordi Gavaldà