


Perill 24h.



Distribució 24h.



Problemes 24h.



Perill 48h.



La setmana evoluciona molt agitada meteorològicament i per tant també les condicions de la neu, l'estabilitat del mantell i el perill d'allaus. La pujada de temperatures, humitat i insolació d'ahir van ajudar a assentar i estabilitzar el conjunt de la nevada des de diumenge. Però la neu nova amb vent arribada del SW constitueixen el problema de neu recent i neu ventada d'avui. El mantell de neu continua especialment delicat en obagues on internament persisteix una estructura molt feble. Els lliscaments basals i les puntuals humides també donaran lloc a activitat d'allaus naturals. L'elecció del terreny conservadora és obligada per mantenir-nos segurs en unes condicions de neu complexes, incertes i perilloses.

Neu ventada i recent



Amb la nevada d'aquesta nit, que està sent més abundant i intensa als límits S i E de la vall, s'han format plaques de neu nova primes i sensibles en vessants protegits del vent i plaques de vent més gruixudes en sotavents del vent del S i E. A partir de la propera nit, torna a revertir-se el procés de formació de plaques, amb gruixos de neu nova més importants al N de la vall i noves acumulacions en els sotavents del vent del NW.

Capes febles persistents



Seguim registrant diàriament woumpfs i esquerdes amb propagacions llargues, demostrant que les capes febles persistents són actives si "encertem" el lloc on la placa no és tan gran gruixuda (prop de roques, arbres, canvis de pendent, convexitats,...). En cas de desencadenament, la capacitat de propagació i la mida destructiva és molt perillosa. Els woumpfs i esquerdes ens indiquen la seva presència i reactivitat, però encara que no percebem indicis no vol dir que no siguin reactives!


Lliscaments i neu humida



Des de fa dos dies que l'activitat de lliscaments és important en vessants típicament herbosos de forta inclinació i orientació solana. Amb les temperatures encara suaus, la humitat elevada i les estones de sol, avui encara poden haver-hi noves allaus d'aquest tipus. Mantenir-se lluny d'aquest tipus de terreny, especialment si observem esquerdes obertes. Amb la insolació possible a partir de migdia, poden produir-se noves allaus petites puntuals de neu humida.

Estat de la neu

Les nevades de les darreres dues setmanes han normalitzat els gruixos de neu, amb 130-150 cm en cotes mitges. La neu és present des del fons de vall, encara que humitejada en cotes baixes. En cotes altes i límits de la vall la neu es troba molt redistribuïda pel vent, amb zones de grans acumulacions i cornises i carenes pelades. En obagues, la base del mantell és feble, formada per cristalls grossos i angulosos que constitueixen capes febles persistents molt perilloses, a més dels problemes superficials relacionats amb la neu recent i la neu ventada.



Meteo

Aquest matí les precipitacions aniran desapareixent, amb força clarianes i estones sol entre migdia i tarda. El vent del SW i S anirà remeient. Al final del dia tornarà a girar al NW anunciant l'entrada d'una nova borrasca que donarà nevades altre cop abundants al vessant atlàntic i amb cota al fons de vall. Descens brusc de les temperatures i vent fort del NW als límits E i S.

24h.



48h.

