


Perill 24h.



Distribució 24h.



Problemes 24h.




Perill 48h.




Els dos problemes que contínuem trobant avui ens exigeixen dues tàctiques ben diferenciades, per una banda a les obagues altes exposades potencialment encara podríem trencar una placa de grans dimensions però la probabilitat és molt reduïda. Davant del dubte, evitem aquest tipus de terreny. En canvi en solanes haurem d'adoptar una tàctica primaveral, treballant la planificació de la sortida per tal d'evitar circular per terreny dret on la neu ja s'hagi transformat.

**Capes febles persistents**


Orientació



Cota



Mida



Probabilitat




Fa setmanes que mantenim aquest problema degut a que les observacions fetes en obagues altes i protegides ens mostren nivells febles enterrats encara actius. De totes formes la probabilitat de desencadenament és baixa i els punts en que podem iniciar aquestes plaques cada cop són més escassos. Cal vigilar en obagues altes amb forta inclinació, pocs suports i mantell prim que és on més fàcilment podríem desencadenar una placa gran amb potencial d'enterrar un grup sencer i afectar tot un vessant.

**Lliscaments i neu humida**


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



El regel nocturn desapareix ràpidament amb els primers rajos de sol i cal gestionar les nostres sortides tenint en compte aquest escalfament típic de condicions primaverals. Cal dissenyar les sortides començant l'activitat en solanes i deixar les obagues pel final del dia. La humitat en solanes dretes i cotes baixes ja ha començat a afectar tot el gruix de neu i a partir de migdia podríem presenciar activitat natural que fàcilment pot deixar el terra al descobert.

**Estat de la neu**

La neu es manté contínua en obagues des dels 1000 m i en solanes per sobre dels 1800 m. Els gruixos varien de 110-155 cm a 2200 m, ja per sota la mitjana per l'època. La crosta de regel nocturna transforma al llarg del dia en solanes on la fusió cada dia penetra més internament. En obagues per sobre dels 2200 m trobarem racons amb neu pols reciclada alternant amb neu ventada sobre crostes dures. En aquests mateixos llocs les capes de neu sucre enterrades al mes de gener es troben fondes però actives.



**Meteo**

Ahir les temperatures van tocar sostre i per avui i demà, encara sota el domini de l'anticicló, al cel hi veurem núvols prims amb temperatures un mica més baixes. La isozero avui baixarà dels 3000 als 2500 m i demà es mantindrà en aquests valors. El vent bufarà fluix amb domini de l'oest.

24h.



48h.

