


Perill 24h.



Distribució 24h.



Problemes 24h.




Perill 48h.




La nevada ha deixat un pam de neu recent freda i lleugera damunt d'un mantell anticipadament primaveral. En cotes baixes no serà suficient per obrir nou terreny ni incrementar el perill d'allaus però en cotes mitges i altes ens retorna per unes dies a condicions hivernals, incloent la formació de plaques implicant la neu nova. En orientacions plenament assolitades el sol d'abril farà reaccionar ràpidament la neu.

**Neu recent**


Orientació



Cota



Mida



Probabilitat




Els 20-25 cm de neu recent acumulada amb oscil·lacions transitòries de la temperatura i canvis de vent ha format plaques implicant tota o part de la neu nova amb una distribució específica: terreny obert i exposat als efectes del vent, i més procliu al desencadenament (dret, convex o parts altes de canaletes). Aquestes poden comportar-se transitòriament més inestables avui per la insolació i pujada lleu de la temperatura i hem de sospitar major capacitat de propagació en indrets molt alts i ben obacs, on localment poden arribar a tapar una persona. Vigilem els indicis de placa reactiva, com fissures, i evitem-les en terreny trampa.

**Neu humida**

Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



La neu recent freda, amb la insolació i l'ascens diürn de la temperatura, s'humitejarà superficialment donant lloc a petites allaus puntuals naturals i també accidentals en terreny de forta inclinació. La neu reaccionarà de manera molt ràpida en solanes, però en obagues la insolació indirecte ja és prou forta com per també causar caiguda de boles i purgues. Vigilem aquest problema especialment si coincideix en terreny trampa.

**Estat de la neu**

La nevada ha deixat una fina i efimera capa de neu recent a totes les cotes i uns 20-25 cm per sobre dels 1800 m. Hi ha base per lliscar a partir de 1600 m en obagues i dels 2000 m en solanes amb neu vella discontinua fins als cims. Les estacions registren gruixos de 70 a 150, deficitaris per l'època. El mantell de neu previ fortament humitejat està encrostant progressivament des de la superfície. Només en obagues molt altes podem sospitar que sota la neu recent s'ha conservat i enterrat la neu pols reciclada, actuant com capa feble persistent potencial de les noves plaques. La possibilitat d'allaus més grans i perilloses degut a l'entrada de la humitat en mantells hivernals queda aturada pel fred d'aquests dies.



**Meteo**

Ens llevem encara amb núvols, boires i algun floc de neu, però al llarg del matí anirà aclarint i a partir de migdia el sol lluirà amb força, amb temperatures encara fredes i vent feble del NW. A partir de la propera nit, es reforçarà el vent del SW i S, el cel es tornarà a tapar i demà arribarà progressivament una nova borrasca pel sud-oest que causarà un nou episodi de nevada de cara dissabte.

24h.



48h.



