


Perill 24h.



Distribució 24h.



Problemes 24h.




Perill 48h.




Les nevades successives d'aquests primers dies d'abril han deixat majors acumulacions de neu recent prop dels límits E i S de l'Aran mentre que cap el nord les quantitats de neu nova acumulada han estat fins ara menys importants. Mentre no aparegui el sol, el perill d'allaus principal són les possibles plaques toves de neu recent o ventada que en terreny específic i favorable a l'acumulació poden arribar a tapar una persona. El sol a partir de migdia-tarda farà reaccionar ràpidament la neu recent.

Neu recent i ventada


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat




La neu recent, que ateny de 40 a 15-20cm, caiguda amb intensitat i vent variable, ha anat formant plaques toves implicant tota o part de la neu recent susceptibles de ser desencadenades accidentalment. Aquestes les hem de sospitar més reactives i probables en cotes altes i als límits E i S on la nevada i el vent han estat més actius. Vigilem els indicis típics de neu amb cohesió com esquerdes i el gruix de la traça variable, i atenció amb els canvis d'orientació, pendent i forma del vessant.

Neu humida


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



A partir de migdia, quan el sol torni a aparèixer y la temperatura pujar lleugerament, farà reaccionar instantàniament la neu recent, humitejant-la i causant allaus puntuals de neu nova humitejada, tant naturals (sota roques, arbres) com accidentals (al pas d'una persona amb esquís a peu) en terreny molt dret. Localment poden implicar prou neu per tapar completament una persona. Atenció a si veiem caure boles de forma espontània pot ésser el preludi de la caiguda d'allaus amb majors conseqüències. El sol d'abril, encara que no incideixi de forma directe, ja és prou potent per causar allaus en gairebé totes les orientacions.

Estat de la neu

Les darreres nevades han deixat gruixos de 20-40 cm de neu recent en cotes mitges i altes, mentre que en cotes baixes la neu recent és efímera i no acaba d'acumular. Hi ha base per lliscar a partir de 1600 m en obagues i dels 2000 m en solanes amb neu vella discontinua fins als cims. Tot i la neu nova, els gruixos són deficitaris per l'època, amb registres de 60 a 160 cm en cotes mitges. El mantell de neu previ a nevar s'ha anat progressivament encrostant però amb la base humida. Aquesta crosta atura per ara la possibilitat d'allaus més grans i perilloses per l'entrada d'humitat. Els principals problemes d'allaus continuen sent superficials, de neu recent o ventada i neu humida.



Meteo

Continuem amb l'aire fred a damunt i el pas successiu de fronts que mantenen el temps inestable i canviant. Avui matí es mantindrà tapat i fred encara amb alguns flocs de neu. A partir de migdia el sol començarà a trencar els núvols i el cel s'anirà obrint fins quedar serà a final del dia. Vent de N bufant feble. Demà dilluns matí variable amb sol i núvols a l'espera d'una nova borrasca que entrarà pel SW i tornarà a donar neu nova amb cota una mica més alta.

24h.



48h.



